


TEOSYAL®-Reihe - Produktübersicht - INDIKATIONEN

								
Konzentration	15 mg/g	20 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	22 mg/g
Füllvermögen	○ ○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○ ○	● ● ● ● ● ●
Nadel	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	27G 1/2	27G 1/2	25G1 NEUE	23G1 NEUE
Indikationen	Revitalisierung und Rehydratation der Dermis mit empfohlenen Behandlungsprotokoll.	Periorbitale, periorale Fältchen und oberflächliche Falten.	Alle mäßig ausgeprägten Falten. Glabellafalten, schwach ausgeprägte Nasolabialfalten und periorale Falten.	Alle mäßig ausgeprägten Falten, ideal für Nachbehandlungen.	Stark ausgeprägte Falten. Tiefe Nasolabial-/Sorgenfalten, Marionettenlinien.	Lippenkonturen, Lippenvolumen und Mundwinkel.	Formung und Wiederherstellung der Gesichtskonturen, sanfter Volumenaufbau, Behandlung extrem tiefer Falten, Tränenrinne	Wangen, Wangenknochen, Augenbrauen, Kinn, Gesichtskontur, Mandibularlinie, Handrücken.
Injektionszone	Oberflächliche Dermis	Obere Dermis	Mittlere Dermis	Mittlere Dermis	Mittlere bis tiefe Dermis	Tiefe Dermis	Subkutanes Gewebe	Subkutan, oberhalb des Periost
Spritzen pro Box	2 x 1 ml	2 x 0.7 ml	2 x 1 ml	2 x 0.5 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	1 x 3 ml
Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Nachbehandlung*	2 bis 3 Monate	ca. 6 Monate	ca. 6 bis 9 Monate	ca. 6 bis 9 Monate	ca. 6 bis 9 Monate	ca. 6 bis 9 Monate	ca. 9 bis 12 Monate	ca. 12 bis 18 Monate

*Zeitraum hängt von mehreren Faktoren ab: vom Hauttyp, vom Schweregrad der zu korrigierenden Falte, von der Injektionszone und vom injizierten Volumen.