






GAMME TEOSYAL® - INDICATIONS ET TABLEAU RÉCAPITULATIF

	TEOSYAL® Meso	TEOSYAL® First Lines	TEOSYAL® Global Action	TEOSYAL® Touch Up	TEOSYAL® Deep Lines	TEOSYAL® Kiss	TEOSYAL® Ultra Deep
Concentration	15 mg/g	20 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g	25 mg/g
Réticulation	○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ● ● ●
Aiguille	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	30G 1/2	27G 1/2	27G 1/2	26G 5/8
Indications	Réhydratation du derme avec protocole de traitement.	Ridules et rides superficielles de la patte d'oie et de la zone péribuccale.	Toutes rides moyennement marquées. Glabeller, sillons nasogéniens peu marqués et rides péribuccales.	Toutes rides moyennement marquées, idéal pour les retouches.	Rides très marquées. Sillons nasogéniens et plis d'amertume profonds. Vallée des larmes peu marquée.	Contours et volume des lèvres.	Création et restauration des volumes, contour du visage, vallée des larmes. Rides très profondes sur peau épaisse.
Zone d'injection							
Conditionnement sous blister	2 x 1 mL	2 x 0.7 mL	2 x 1 mL	2 x 0.5 mL	2 x 1 mL	2 x 1 mL	2 x 1 mL
Durée estimée avant retouche*	2 à 3 mois	6 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	6 à 9 mois en moyenne	9 à 12 mois en moyenne

*Cette durée moyenne dépend de plusieurs facteurs: le type de peau du patient, la sévérité de la ride à corriger, le type d'injection (derme superficiel, moyen ou profond) et le volume injecté.